



CURVA DE CONTAGIOS POR COVID-19
MONITOREO AL DESARROLLO DE LA 4ta OLA EN ORURO Y BOLIVIA
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN MÁXIMA A TRAVÉS DE LAS CURVAS: GOMPERTZ, REGRESIÓN LOGÍSTICA y SIR
REPORTE N° 98 (Datos al domingo 24 de abril de 2022)

Vallejos Mamani Pedro Román

PARTE DEL COMITÉ EPIDEMIOLÓGICO COVID 19 – UTO



Coordinador Dirección de Postgrado – UTO; Docente Titular – Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (FCAN)

vallejos_pedro@yahoo.es

Cel: + 591 72462547

BOLIVIA

BOLIVIA - MONITOREO DE LA CURVA DE CONTAGIOS POR COVID-19





BOLIVIA:

- Luego de 14 semanas continuas de desescalada, entre la semana 13 y 14 se ha reportado un incremento de casos en un 10% (de 73 a 82 casos promedio día/semana).
- En el pico de la 4ta ola, se reportó promedio 54 personas fallecidas/día, disminuyendo a casi cero en las 5 últimas semanas.
- La 4ta ola se caracterizó por una alta tasa de contagios, en el pico (09 y 16/01/2022) se alcanza a 11024 casos día, 6.7 veces más que la 1ra; 4.9 veces más que la 2da; 3.9 veces más que la 3ra ola.
- La característica de la 4ta ola fue la alta tasa de contagios y la baja tasa de letalidad (0.4 a 0.6 %).
- Según el monitoreo de datos (local, nacional e internacional), se ha observado que, los picos de las olas han presentado un comportamiento estacional (invierno, verano), por lo que es probable un incremento de casos para mayo y junio de 2022.
- La aglomeración de personas y el descuido de las medidas de bioseguridad, inciden de manera importante en el retraso o adelanto de los picos de contagios.



ORURO

ORURO - CURVA DE CONTAGIOS POR COVID-19




ORURO:

- Reporta 14 semanas continuas de desescalada, se mantiene promedio de contagios de uno por día semana.
- En el pico de la 4ta ola se reportó promedio de 5 personas fallecidas/día, disminuyendo a casi cero personas fallecidas/día en las 10 últimas semanas.
- La 4ta ola se caracterizó por una alta tasa de contagios, en el pico (09 y 16/01/2022) se alcanza a 839 casos/día, 10.6 veces más que la 1ra; 5.6 veces más que la 2da; 4.1 veces más que la 3ra ola.
- La característica de la 4ta ola fue la alta tasa de contagios y la baja tasa de letalidad (0.4 a 0.6 %).
- Según el monitoreo de datos (local, nacional e internacional), se ha observado que, los picos de las olas han presentado un comportamiento estacional (invierno, verano), por lo que es probable un incremento de casos para mayo y junio de 2022.
- La aglomeración de personas y el descuido de las medidas de bioseguridad, inciden de manera importante en el retraso o adelanto de los picos de contagios.




LA PAZ






COCHABAMBA




CHUQUISACA






TARIJA




PANDO





BENI



SANTA CRUZ

